

Trollsländeleken

De tidigaste trollsländorna fanns redan innan dinosaurierna och det har funnit trollsländor med ett vingspann på ca 70 cm. Trollsländor har ofullständig förvandling, dvs de har inget puppstadium, utan får sitt vuxna utseende med vingar efter sin sista hudömsning. De ömsar hud upp till 15 gånger. Deras utveckling är ägg – trollsländelarv – vuxen (efter sista hudömsningen).

För åk 2 och uppåt:

- Gå igenom trollsländans utvecklingsstadier och visa bilder på de olika utvecklingsstadierna. Gå sedan igenom dem igen med en rörelse för varje stadie. Ägg – larv med små käkar (glupskt rovdjur) – larv med stora käkar (glupskt rovdjur) – larv som krupit upp på vasstrå – simulera larven när den kryper ut sin hud vid sista hudömsningen och har fått vingar – sträck ut vingarna och torka dem – flyg iväg!
- Själva leken går till så att alla är ägg från början och går runt med armarna i cirkel ovanför huvudet
- Gå fram till ett annat ägg
- Gör sten – sax – påse och den som vinner går upp till nästa utvecklingsstadie – liten larv. Den andra stannar kvar som ägg och får försöka igen med ett annat ägg. Den lilla larven går fram till en annan liten larv och gör Sten-sax-påse. Den som vinner går upp till nästa utvecklingsstadie – stor larv. Man fortsätter på samma sätt genom hela utvecklingscykeln. Om man vill kan man låtsas "lägga ägg" när man blivit vuxen och blir sedan ägg igen. Eller så fortsätter man flyga runt och när alla blivit vuxna är leken slut.

För yngre deltagare: Stå i en ring och gör de olika rörelserna till utvecklingsstadierna tillsammans. Flyg runt som vuxna trollsländor.



Kejsartrollslända lägger ägg. ID [153220310](#) | [Dragonfly Laying Eggs](#) © [Nigel Hoy](#) | [Dreamstime.com](#)



Trollsländeägg. ID [194836596](#) | [Dragonfly Eggs](#) © [Swee Ming Young](#) | [Dreamstime.com](#)







Tegelröd ängstrollslända. Blekinge. Foto Inna Ljungblom, www.naturifokus.se